

Sp. 3. *Cl. Croulinensis*, n. s.

Testa longitudinaliter rotundato-ovata, convexiuscula, tenuis, pellucida, nitida, glabra, alba, ad apicem purpurascens, lateribus ferruginosis, antice subangulata, postice rotundata. Umbones prominuli, recti, fere contigui. Denticulus cardinalis obtusus et valde indistinctus. Long.  $\frac{1}{20}$ , lat.  $\frac{1}{25}$  unc.

Croulin Island, between Skye and the mainland of Ross-shire towards Applecross, where six specimens were found by Mr. Barlee and myself with the other species.

*Abra* (Leach) *profundissima*. *Ligula profundissima*, Forbes, Brit. Assoc. Rep. 1843, p. 191. Two young specimens occurred to us with the last.

*Lepton nitidum*, Turton, Br. Biv. p. 63. A single valve was found by us in dredging off Skye; but it is questionable whether this species is not the fry of *L. squamosum*.

The *Corbula granulata* of Nyst is I believe the *Poromya anatinoides* of Forbes's Report on the Ægean Invertebrata.

*Næra costellata* (*Corbula*, Desh.), Forbes, Lovén, p. 48. Mr. Barlee procured a specimen of this exquisite shell from Loch Fyne, and kindly placed it in my cabinet.

The *Næra abbreviata* of Forbes is the *N. vitrea* of Lovén, p. 48.

Norton near Swansea, June 21, 1847.

VI.—*Characters of undescribed Chalcidites collected in North America by E. Doubleday, Esq., and now in the British Museum.* By FRANCIS WALKER, F.L.S.

[Continued from vol. xix. p. 398.]

17. *Eupelmus Fonteia*, fem. *Cupreus*, antennæ nigræ, pedes fulvi, femora piceo cincta, tarsi flavi, alæ sublimpidæ.

Corpus angustum, lineare, convexum, cupreum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi picei, mediocres, non extantes: antennæ nigræ, clavatæ, 11-articulatæ, thorace vix longiores; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis; 2<sup>us</sup> longicyathiformis; 3<sup>us</sup> minutus; 4<sup>us</sup> et sequentes mediocres, usque ad 10<sup>um</sup> curtantes et latescentes; clava longiconica, compressa, articulo 10<sup>o</sup> duplo longior: thorax sublinearis: prothorax transversus, brevis, antice angustus, utrinque viridivarius: mesothoracis scutum excavatum, latitudine longius; parapsidum suturæ sat bene determinatæ, postice non approximatae; paraptera et epimera magna; scutellum obconicum; mesothoracis sternum maximum, cyaneo-viridivarium; metathorax sat magnus, subquadratus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, supra depressum, subtus carinatum, thoracis longitudine et latitudine; segmentum 1<sup>um</sup> magnum, 2<sup>um</sup> et sequentia

breviora, subæqualia : oviductus subexsertus ; vaginæ nigræ : pedes fulvi ; coxæ cupreæ ; femora piceo cincta ; mesotarsi et metatarsi flavi, apice fusi ; mesopedum tibiæ apice spina magna armatæ, tarsi lati basi ciliati : alæ sublimpidæ, angustæ ; squamulæ fulvæ ; nervi fulvi ; nervus ulnaris humerali vix brevior radiali plus duplo longior, cubitalis subincurvus radiali paullo brevior ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $1\frac{1}{2}$  ; alar. lin.  $2\frac{1}{4}$ .)

Var.  $\beta$ . Femora omnino fulva.

Allied to *Eup. urozonus*, Dalman.

18. *Eupelmus Lamachus*, fem. *Cupreus*, abdomen rubro micans, antennæ nigræ, pedes flavi, alæ limpidæ.

Corpus sublineare, convexum, cupreum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, cyaneum, thoracis latitudine ; vertex viridi-cupreus, sat latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ nigræ, clavatæ, 11-articulatæ, fronte insertæ, thorace vix longiores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> longicyathiformis ; 3<sup>us</sup> minutus ; 4<sup>us</sup> et sequentes mediocres, usque ad 10<sup>um</sup> curtantes et latescentes ; clava longiconica, compressa, articulo 10<sup>o</sup> duplo longior : thorax subovatus, viridi et rubro varius : prothorax transversus, brevis, antice angustus : mesothoracis scutum excavatum, latitudine longius ; parapsidum suturæ sat bene determinatæ, postice non approximata ; paraptera et epimera magna ; scutellum obconicum ; sternum maximum : metathorax sat magnus, subquadratus, declivis : petiolus brevissimus : abdomen ovatum, læve, supra rubro-cupreum, depressum, subtus carinatum, thoracis longitudine et latitudine : oviductus subexsertus, flavus, apice fuscus : pedes læte flavi ; tarsi apice fusi ; mesopedum tibiæ apice spinis armatæ, tarsi lati basi subtus ciliati : alæ limpidæ ; squamulæ fulvæ ; nervi flavi ; nervus ulnaris humerali vix brevior radiali plus duplo longior, cubitalis subincurvus radiali non brevior ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $1\frac{1}{4}$  ; alar. lin. 2.)

19. *Eupelmus Epicaste*, fem. *Apterus*, nigro-cyaneus piceo varius, pedes picei, tarsi flavi.

"*E. vesiculari* affinis," Hal. MSS. Corpus apterum, angustum, sublineare, convexum, nitens, piceo- et nigro-cyaneum, subtilissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, thorace paullo latius ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi rufi, sat magni, non extantes : antennæ nigræ, clavatæ, 11-articulatæ, thorace non breviores ; articulus 1<sup>us</sup> fulvus, longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> longicyathiformis ; 3<sup>us</sup> minutus ; 4<sup>us</sup> et sequentes mediocres, usque ad 10<sup>um</sup> curtantes et latescentes ; clava longiconica, compressa, articulo 10<sup>o</sup> duplo longior : thorax longiovatus : prothorax transversus, sat magnus, antice angustus : mesothoracis scutum excavatum, latitudine longius ; parapsidum suturæ non bene determinatæ ; scutellum obconicum : metathorax magnus, subquadratus, declivis : petiolus brevissimus : abdomen subfusiforme, læve, subcompressum, supra depressum, subtus carinatum, thorace paullo angustius non longius : oviductus exsertus, flavus ; vaginæ flavæ, basi et apice nigræ, abdominis dimidio

longiores : pedes picei ; trochanteres fulvi ; genua fulva ; tarsi flavi, apice fusci ; metatibiæ fulvæ ; mesopedum tibiæ apice spinis armatæ, tarsi lati subtus ciliati. (Corp. long. lin.  $1\frac{1}{4}$ .)

Allied to *Eup. Degeeri*, Dalman.

20. Encyrtus (Cerchysius) Flaccus, fem. *Nigro-viridis, abdomen nigrum, antennæ nigræ, pedes nigro-picei, tarsi flavi, proalæ nigro-fusæ basi et apice limpidæ.*

Corpus angustum, sublineare, convexum, nigro-viride, nitens, læve, parce hirtum : caput piceum, transversum, breve, thoracis longitudine ; vertex sat latus ; frons abrupte declivis, non impressa : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ nigræ, subclavatæ, thorace longiores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> longicyathiformis ; 3<sup>us</sup> minutus ; 4<sup>us</sup> et sequentes usque ad 11<sup>um</sup> transversi, lati ; clava conica, articulo 11<sup>o</sup> longior : thorax longiovatus : prothorax transversus, brevis, antice angustior : mesothoracis scutum magnum, longitudine paullo latius ; parapsidum suturæ non conspicuæ ; scutellum obconicum, parvum, apice ferrugineum, metathorax brevis, postice angustus : petiolus nullus : abdomen fusiforme, nigrum, supra depressum, apice acuminatum, thorace paullo angustius vix longius : oviductus fulvus, subexsertus : pedes nigri ; femora picea ; tarsi flavi, apice fusci ; protarsi fulvi ; mesotarsi lati : alæ angustæ ; proalæ nigro-fusæ, basi et apice limpidæ ; squamulæ nigræ ; nervi picei. (Corp. long. lin. 1 ; alar. lin.  $1\frac{1}{2}$ .)

21. Encyrtus Gastron, fem. *Æneus, abdomen cupreum, pedes flavi, alæ limpidæ.*

Corpus angustum, sublineare, æneum, convexum, nitens, læve, parce hirtum : caput transversum, breve, thorace paullo latius ; vertex sat latus ; frons abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : thorax ovatus : prothorax brevissimus, supra vix conspicuus : mesothoracis scutum magnum, transversum ; parapsidum suturæ non conspicuæ ; scutellum parvum, obconicum : metathorax brevis, transversus : petiolus nullus : abdomen cupreum, ovatum, depressum, basi viridi-æneum, thorace paullo longius et latius : pedes flavi ; coxæ ænæ ; mesopedum tibiæ apice spinis armatæ, tarsi lati : alæ angustæ, limpidæ ; squamulæ fulvæ ; nervi flavi. (Corp. long. lin.  $\frac{3}{4}$  ; alar. lin.  $1\frac{1}{4}$ .)

Allied to *Enc. subcupratus*, Dalman.

22. Encyrtus Vectius, mas. *Viridis, abdomen purpureo-cupreum, antennæ fusæ, pedes flavi, alæ sublimpidæ.*

Corpus breve, robustum, convexum, nitens, punctatum, viride, parce hirtum : caput transversum, breve, thoracis latitudine ; vertex sat latus ; frons abrupte declivis : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ fusæ, hirtæ, filiformes, corpore non breviores, ad os insertæ ; articulus 1<sup>us</sup> longifusiformis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup> minutus ; 4<sup>us</sup> et sequentes longi, subæquales ; clava longipisiformis, articulo 9<sup>o</sup> paullo longior : thorax breviovatus : prothorax transversus, brevissimus : mesothoracis scutum magnum, longitudine latius ; parapsi-

dum suturæ non conspicuæ; scutellum magnum, obconicum, sericeum, parum nitens: metathorax brevissimus: petiolus nullus: abdomen obconicum, læve, depressum, purpureo-cupreum, basi cyaneo-viride, thorace brevius: pedes flavi, graciles; mesopedes longi, tibiæ apice spinis armatæ, tarsi lati fulvi: alæ sublimpidæ, apice fuscæ; squamulæ piceæ; nervi fusci; nervus humeralis longissimus, radialis et ulnaris brevissimi, cubitalis brevis; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{2}{3}$ ; alar. lin.  $1\frac{2}{3}$ .)

Allied to *Enc. Batillus*, Ent. Mag. iv. 442.

23. *Encyrtus* Reate, mas. *Piceus, subtus ferrugineus, abdomen basi cupreum, antennæ nigræ, pedes fulvi piceo et flavo varii, proalæ nigro-fuscæ basi limpidæ.*

Corpus angustum, sublineare, fere planum, piceum, obscurum, subtilissime punctatum, parce hirtum, subtus ferrugineum læve nitens: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex sat latus; frons abrupte declivis: palpi picei: oculi rufi, mediocres, non extantes: antennæ graciles, filiformes, nigræ, dense pubescentes, corpore paullo longiores; articulus 1<sup>us</sup> longus, sublinearis, fulvus; 2<sup>us</sup> cyathiformis; 3<sup>us</sup> minutus; 4<sup>us</sup> et sequentes longi, lineares, subæquales; clava linearis, articulo 9<sup>o</sup> paullo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum magnum, longitudine latius, parapsidum suturæ non conspicuæ; paraptera magna fulva; scutellum obconicum, mediocre: metathorax brevis, transversus, postice angustus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, nitens, læve, depressum, basi cupreum, thorace brevius: pedes fulvi, longi, graciles, subtus pallide flavi, supra fusco vittati; mesopodum tibiæ apice spinis armatæ, tarsi lati flavi apice fusci; metapedum femora fusca basi fulva, tibiæ piceæ, tarsi flavi apice fusci: alæ angustæ; proalæ nigro-fuscæ, basi limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin.  $\frac{2}{3}$ —1; alar. lin.  $1\frac{1}{3}$ .)

Allied to *Enc. Lindus*, Ent. Mag. iv. 451.

24. *Closterocerus* Damastes, fem. *Cyaneo-viridis, abdomen purpureum, antennæ nigræ, pedes albidī, proalæ fusco fasciatæ.*

Corpus sat latum, sublineare, læve, depressum, cyaneo-viride, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, viride, antice impressum, thoracis latitudine; vertex sat latus; frons abrupte declivis: oculi rufi, mediocres, extantes: antennæ nigræ, pubescentes, subsetacæ, thorace vix longiores; articulus 1<sup>us</sup> fusiformis, gracilis; 2<sup>us</sup> cyathiformis; 3<sup>us</sup> et sequentes mediocres, quisque præcedente angustior; ultimus setiger: thorax ovatus: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum magnum, longitudine latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum magnum, brevi-obconicum: metathorax transversus, minimus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, nitens, læve, basi cyaneo et cupreo-varium, thorace vix longius; discus purpureus: pedes albidī, graciles, simplices, subæquales; coxæ virides: alæ limpidæ; proalæ latæ, apud stigma fusco fasciatæ; squamulæ piceæ; nervi fusci; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis et



cubitalis brevissimi; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{3}{4}$ ; alar. lin.  $1\frac{1}{4}$ .)

25. Entedon Imbrasus, fem. *Cyaneo-viride, abdomen cyaneum, discus purpureus, pedes albidī, alæ limpidæ.*

Corpus sublineare, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi rufi, mediocres, non extantes: thorax ovatus; dorsum fere planum: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ sat bene determinatæ; scutellum magnum, obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, depressum, cyaneum, thorace non longius; discus purpureus: pedes albidī, simplices, subæquales; coxæ virides; tarsi apice fuscī: alæ limpidæ; squamulæ fuscæ; nervi fulvi; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis et cubitalis brevissimi; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{2}{3}$ ; alar. lin. 1.)

Allied to *Ent. Latreillii*, Curtis.

26. Entedon (Horismenus) Sardus, fem. *Atrum, antennæ nigræ, basi flavæ, pedes flavi, alæ limpidæ.*

Corpus atrum, æneo et viridi varium, convexum, validum, nitens, læve, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace non latius; vertex sat latus; frons abrupte declivis: oculi picei, mediocres, non extantes: antennæ nigræ, clavatæ, moniliformes, thorace breviores; articulus 1<sup>us</sup> flavus, longus, gracilis; 2<sup>us</sup> cyathiformis; 3<sup>us</sup>, 4<sup>us</sup> et 5<sup>us</sup> subæquales, discreti; clava conica, articulo 5<sup>o</sup> multo latior et longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ, postice approximatae; scutellum magnum, brevi-obconicum, unisulcatum: metathorax magnus, obconicus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, apice acuminatum, thoracis fere longitudine et latitudine; segmentum 1<sup>um</sup> magnum; 2<sup>um</sup> et sequentia breviora, subæqualia: pedes flavi, simplices, subæquales; coxæ nigræ; tarsis articuli 1<sup>o</sup> ad 3<sup>um</sup> longitudine decrescentes, 4<sup>us</sup> 3<sup>o</sup> paullo longior; ungues et pulvilli minuti, fuscī: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fuscī; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis brevissimus; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{3}{4}$ ; alar. lin.  $1\frac{1}{4}$ .)

27. Entedon (Euderus) Herillus, fem. *Nigro-cyaneum, antennæ nigræ, pedes nigro-cyanei, tarsi albidī, alæ albo limpidæ.*

Corpus sublineare, convexum, nigro-cyaneum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum, subtus purpureum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi rufi, mediocres, non extantes: antennæ nigræ, subclavatæ, thorace non breviores; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis; 2<sup>us</sup> cyathiformis; 3<sup>us</sup> et sequentes mediocres, usque ad clavam latescentes; clava ovata, articulo præcedente duplo longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine, non latius; parapsidum

suturæ optime determinatæ, postice approximatae; scutellum obconicum, magnum: metathorax mediocris, declivis, obconicus: petiolus brevissimus: abdomen longifusiforme, nitens, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thorace angustius et multo longius: pedes nigro-cyanei, simplices, subæquales; protarsi fusci; mesotarsi et metatarsi albidii, apice fusci: alæ albo-limpidae; squamulae piceae; nervi pallide flavi; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis et cubitalis brevissimi; stigma minutum. (Corp. long. lin. 2; alar. lin.  $2\frac{1}{2}$ .)

28. *Eulophus Calavius*, mas et fem. *Viridis cupreo varius, abdomen mari flavo maculatum, pedes mari flavi, fem. fulvi, proalæ fusco maculatæ.*

*Mas.*—Corpus longum, gracile, sublineare, convexum, nitens, viride, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi rufi, mediocres, non extantes: ocelli vertice triangulum fingentes: antennae filiformes, nigrae, triramosae, thorace paullo longiores; articulus 1<sup>us</sup> longus, sublinearis; 2<sup>us</sup> cyathiformis; 3<sup>us</sup>, 4<sup>us</sup> et 5<sup>us</sup> ramulos basi emittentes graciles hirtos; 6<sup>us</sup> et 7<sup>us</sup> longi, lineares; clava fusiformis, articulo 7<sup>o</sup> longior: thorax fusiformis: prothorax sat magnus, angustus, conicus, latitudine longior: mesothoracis scutum parvum, longitudine latius; parapsidium suturæ bene determinatæ, postice approximatae; scutellum mediocre, subconicum: metathorax magnus, obconicus, striatus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, læve, depressum, thorace multo brevius non angustius, basi flavo maculatum; discus purpureus: pedes flavi, graciles, simplices, subæquales; coxæ virides; tarsi apice fusci; protarsi fulvi: alæ limpidae, angustae; squamulae piceae; nervi fusci; nervus humeralis ulnari paullo longior, ulnaris radiali plus duplo longior, cubitalis brevis; stigma minutum; proalæ cuique apud discum macula fere obsoleta fusca. (Corp. long. lin.  $1-1\frac{1}{4}$ ; alar. lin.  $1\frac{3}{4}-2$ .)

*Var. β.* Proalæ apice obsolete fusco nebulosae: antennis articulus 1<sup>us</sup> basi flavus.

*Var. γ.* Corpus cyaneo et æneo varium.

*Fem.* Corpus æneum, viridi varium: antennae nigrae, subclavatæ, 9-articulatæ, thorace non longiores; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis, fulvus, apice niger; 2<sup>us</sup> cyathiformis; 3<sup>us</sup> et sequentes longi usque ad 6<sup>um</sup> curtantes et latescentes; clava conica, acuminata, articulo 6<sup>o</sup> longior: abdomen longiovatum, purpureo-cupreo, basi viride, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace non brevius; segmenta subæqualia: pedes fulvi; coxæ virides; mesotarsi et metatarsi flavi, apice fusci: alæ limpidae; proalæ apice obsolete fusco nebulosae, macula cuique in disco magna distincta fusca. (Corp. long. lin.  $1\frac{1}{4}-1\frac{3}{4}$ ; alar. lin.  $1\frac{3}{4}-2\frac{1}{4}$ .)

*Var. β.* Thoracis discus cupreus.

*Var. γ.* Femora fusco cincta.

*Var. δ.* Proalis maculae vix conspicuæ.

*Var. ε.* *Var. β.* et *δ.* similis: antennis articulus 1<sup>us</sup> niger, basi fulvus: tibiæ flavæ.

29. *Eulophus Iphinoë*, mas. *Nigro-viridis*, abdomen cupreum, antennæ piceæ, pedes flavi, femora fulva, metafemora fusca, alæ limpidae.

Corpus nigro-viride, breve, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, thorace latius ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ piceæ, longæ, graciles, filiformes, triramosæ, corpore vix breviores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, linearis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup>, 4<sup>us</sup> et 5<sup>us</sup> ramulos basi emittentes graciles hirtos ; 6<sup>us</sup> et 7<sup>us</sup> longi, lineares ; clava sublinearis, acuminata : thorax ovatus : prothorax transversus, brevis, antice angustus : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ non bene determinatæ ; scutellum obconicum : metathorax sat magnus, obconicus, declivis : petiolus brevis : abdomen ovatum, læve, cupreum, depressum, thorace multo brevius : pedes flavi, longi, graciles, simplices, subæquales ; coxæ virides ; femora fulva ; tarsi apice fusci ; metafemora fusca : alæ limpidae ; squamulæ fusca ; nervi flavi ; nervus humeralis ulnari vix longior, radialis ulnari brevior, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{2}{3}$  ; alar. lin. 1.)

30. *Eulophus Cyriades*, mas. *Nigro-viridis*, abdomen cupreum basi flavum, antennæ nigrae, pedes fulvi piceo varii, alæ limpidae.

Corpus breve, robustum, convexum, nigro-viride, nitens, scitissime squameum, parce hirtum, subtus cyaneo et purpureo varium : caput transversum, breve, thorace paullo latius ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ triramosæ, nigrae, longæ, graciles, filiformes ; articulus 1<sup>us</sup> longus, linearis, nigro-cupreus ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup>, 4<sup>us</sup> et 5<sup>us</sup> ramulos basi emittentes graciles hirtos : thorax ovatus : prothorax transversus, brevis : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ non bene determinatæ ; scutellum brevi-obconicum : metathorax sat magnus, obconicus, declivis : petiolus brevis : abdomen sublineare, læve, depressum, cupreum, basi flavum, thorace brevius : pedes fulvi, simplices, subæquales ; coxæ basi nigro-cyaneæ ; femora piceo vittata ; tarsi apice fusci ; metatibiæ apice fusca : alæ limpidae ; squamulæ piceæ ; nervi fusci ; nervus humeralis ulnari vix longior, radialis ulnari brevior, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{3}{4}$  ; alar. lin.  $1\frac{1}{4}$ .)

31. *Eulophus Minio*, fem. *Æneo-viridis*, abdomen nigro-cupreum, antennæ piceæ, pedes fulvi, alæ limpidae.

Corpus æneo-viride, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, thorace non latius ; vertex sat latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ piceæ, submoniliformes, extrorsum crassiores, thorace paullo longiores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup> et sequentes longi, usque ad 6<sup>um</sup> curtantes et latescentes ; clava conica, acuminata, articulo 6<sup>o</sup> longior : thorax longiovatus : prothorax magnus, conicus : mesothoracis scutum transversum, breve ; parapsidum suturæ bene determinatæ, postice approximatae ;

scutellum subconicum : metathorax magnus, obconicus, declivis : petiolus brevis : abdomen nigro-cupreum, ovatum, læve, depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo brevius et latius : pedes fulvi, simplices, subæquales ; tarsi apice fusci : alæ limpidæ ; squamulæ piceæ ; nervi fulvi ; nervus humeralis ulnari vix longior, radialis ulnari brevior, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin. 1 ; alar. lin.  $1\frac{3}{4}$ .)

32. *Eulophus Gobryas*, mas. *Æneus*, caput nigrum, abdomen nigro-cupreum, antennæ nigrae, pedes flavi, femora nigro-ænea, alæ limpidæ.

Corpus breve, latum, convexum, parce hirtum : caput transversum, breve, nigrum, nitens, scitissime squameum, thoracis latitudine ; vertex sat latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ nigrae, clavatae, thorace breviores ; articulus 1<sup>us</sup> fulvus, longus, linearis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 4<sup>us</sup> 3<sup>o</sup> brevior 5<sup>o</sup> longior ; clava longiconica, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> multo longior : thorax ovatus, altus, æneus, scite squameus, parum nitens : prothorax transversus, sat magnus, antice angustus : mesothoracis scutum breve, longitudine latius ; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ, postice approximatae ; scutellum subovatum : metathorax magnus, obconicus, declivis : petiolus brevis : abdomen ovatum, nitens, læve, depressum, nigro-purpureum, basi viridi et cupreo micans, thorace brevius : pedes flavi, simplices, subæquales ; coxæ nigro-æneæ ; trochanteres picei ; femora nigro-ænea, apice flava ; tarsi apice fusci, articulus 2<sup>us</sup> 1<sup>o</sup> brevior 3<sup>o</sup> longior, 4<sup>us</sup> 3<sup>o</sup> paullo longior : alæ limpidæ, sat latae ; squamulæ piceæ ; nervi fulvi ; nervus humeralis ulnari vix longior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $1\frac{1}{4}$  ; alar. lin. 2.)

Allied to *Eulophus ramicornis*, Geoffroy.

33. *Eulophus Minyas*, fem. *Cupreus cyaneo-viridi varius*, antennæ piceæ, pedes fulvi, femora nigro-viridia, proalæ fusco maculatæ.

Corpus cupreum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum, utrinque cyaneo-viridi varium, subtus cyaneo-viride : caput transversum, breve, thoracis latitudine ; vertex sat latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi rufi, sat magni, non extantes : antennæ piceæ, clavatae, thorace breviores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis, fulvus ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 4<sup>us</sup> 3<sup>o</sup> brevior 5<sup>o</sup> longior ; clava ovata, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> paullo longior : thorax ovatus : prothorax transversus, brevissimus : mesothoracis scutum magnum, longitudine latius ; parapsidum suturæ bene determinatæ, postice approximatae ; scutellum magnum, subconicum : metathorax brevis, declivis : petiolus brevissimus : abdomen ovatum, læve, basi cyaneo-viride, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace non longius ; discus nigro-purpureus : pedes fulvi, simplices, subæquales ; coxæ nigro-virides ; trochanteres picei ; femora nigro-viridia, apice fulva ; tarsi apice fusci : proalæ subfuscae ; macula cuique apud nervum ulnarem magna fusca ; squamulæ piceæ ; nervi basi fulvi apice fusci ; nervus humeralis ulnari non longior, radialis



ulnari multo brevior, cubitalis longus in alæ discum abrupte declivis ; stigma minutum. (Corp. long. lin. 1 ; alar. lin.  $1\frac{1}{2}$ .)

Allied to *Eul. gallarum*, Nees d'Essenbeck.

34. *Elachestus Levana*, fem. *Ater, abdominis discus fulvus, antennæ fuscae, pedes flavi fusco cincti, alæ limpidæ.*

Corpus atrum, convexum, punctatum, parum nitens, parce hirtum : caput transversum, breve, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ fuscae, subclavatae, moniliformes, thorace breviores ; articulus 1<sup>us</sup> fulvus, longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup> et sequentes mediocres, discreti, usque ad 5<sup>um</sup> curtantes et latescentes ; clava conica, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> longior : thorax longiovatus : prothorax transversus, brevis, antice angustus : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ non bene determinatæ ; scutellum nitens, læve, subconicum : metathorax magnus, obconicus, declivis : petiolus longissimus, abdomine paullo brevior : abdomen subrotundum, nitens, læve, depressum, thoracis dimidio non longius ; discus fulvus ; segmentum 1<sup>um</sup> magnum, 2<sup>um</sup> et sequentia brevia : pedes flavi, simplices, subæquales ; coxæ piceæ ; ungues et pulvilli fusci ; mesotibiæ apice spinis longis validis armatæ ; metapedum femora apice fusca, tibiæ fuscae basi flavæ : alæ limpidæ ; squamulæ fulvæ ; nervi flavi ; nervus humeralis ulnari non longior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin. 1— $1\frac{1}{4}$  ; alar. lin.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ .)

*Var. β.* Metatibiæ flavæ, apice fuscae.

Allied to *Elachestus dimidiatus*, Nees d'Ess.

35. *Cirrospilus Eunapius*, fem. *Nigro-purpureus, abdomen basi flavum, antennæ fuscae, pedes flavi piceo cincti, proalæ fusco fasciatæ.*

Corpus angustum, sublineare, convexum, nigro-purpureum, scitissime squameum, parum nitens, parce hirtum : caput transversum, breve, thoracis latitudine ; vertex sat latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ breves, fuscae, clavatae, thorace breviores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup> et sequentes mediocres, usque ad 5<sup>um</sup> curtantes et latescentes ; clava conica, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> longior et latior : thorax ovatus : prothorax magnus, conicus : mesothoracis scutum læte flavum, breve, transversum ; parapsidum suturæ non bene determinatæ ; scutellum nitens, læve, obconicum : metathorax mediocris, obconicus, declivis : petiolus brevissimus : abdomen ovatum, nitens, læve, basi flavum, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace non longius : pedes flavi, graciles, simplices, subæquales ; coxæ piceæ ; femora picea, apice flava ; tibiæ fuscae, basi flavæ ; tarsi apice fusci : alæ limpidæ, angustæ ; proalæ cuique medio fascia lata fusca bene determinata ; squamulæ fulvæ ; nervi flavi ; nervus ulnaris humerali paullo longior, radialis ulnari multo brevior ; cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{3}{4}$  ; alar. lin. 1.)

*Var. β.* Femora nigro-picea ; tibiæ piceæ.

Allied to *Cirr. flavo-varius*, Nees d'Ess.

36. *Tetrastichus* Gala, fem. *Fulvus*, abdomen piceum, antennæ nigræ, pedes flavi, alæ limpide.

Corpus breve, latum, convexum, nitens, læve, fulvum, parce hirtum : caput piceum, transversum, brevissimum, impressum, thorace non latius ; vertex sat latus ; frons abrupte declivis : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ nigræ, subclavatæ, thorace paullo longiores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, linearis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup>, 4<sup>us</sup> et 5<sup>us</sup> mediocres, subæquales ; clava longiconica, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> paullo longior et latior : thorax ovatus : prothorax brevissimus, supra vix conspicuus : mesothoracis scutum magnum, longitudine vix latius ; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ, postice approximatae ; scutellum magnum, subrotundum, bisulcatum : metathorax mediocris, transversus, postice angustus : petiolus brevissimus : abdomen piceum, ovatum, basi fulvum, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo latius non longius : pedes flavi, simplices, subæquales ; tarsi apice fusi : alæ limpide, latæ ; squamulæ fulvæ ; nervi fulvi ; nervus ulnaris humerali paullo longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{3}{4}$  ; alar. lin.  $1\frac{1}{2}$ .)

Allied to *Tetrastichus Armæus*, Ann. Nat. Hist. xi. 200 ; and to *T. Metra*, A. N. H. xi. 201.

37. *Tetrastichus* Hæmon, fem. *Ater*, antennæ nigræ, pedes picei, tibiæ apice albidæ, tarsi flavi, alæ sublimpide.

Corpus breve, validum, convexum, atrum, parum nitens, subtilissime punctatum, parce hirtum : caput transversum, impressum, brevissimum, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ nigræ ; articulus 1<sup>us</sup> longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup> et sequentes mediocres, usque ad 5<sup>um</sup> curtantes et latescentes ; clava conica, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> longior : thorax ovatus : prothorax transversus, brevis, mesothoracis scutum magnum, longitudine latius ; parapsidum suturæ bene determinatæ, postice approximatae ; scutellum obconicum, bisulcatum : metathorax declivis, mediocris, postice angustus : petiolus brevissimus : abdomen longiovatum, parum nitens, supra convexum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius ; segmenta 1<sup>o</sup> ad 4<sup>um</sup> subæqualia, 5<sup>um</sup> paullo longius, 6<sup>um</sup> et 7<sup>um</sup> minora : pedes picei, simplices, subæquales ; coxæ nigræ ; genua fulva ; tibiæ fusæ ; mesopedum et metapedum tibiæ apice albidæ, tarsi flavi, apice fusi ; protarsi fulvi : alæ sublimpide ; squamulæ piceæ ; nervi fusi ; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin. 1 ; alar. lin.  $1\frac{1}{2}$ .)

Allied to *Tetrastichus Paralus*, Mon. Chal. i. 296.

38. *Tetrastichus* Epidius, fem. *Ater*, antennæ nigræ, pedes fulvi, femora picea, tibiæ apice albidæ, tarsi flavi, alæ sublimpide.

Corpus longum, angustum, convexum, atrum, parum nitens, sub-

tilissime punctatum, parce hirtum : caput transversum, breve, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ nigræ, subclavatæ, thorace longiores ; articulus 1<sup>us</sup> piceus, longus, gracilis ; 2<sup>us</sup> longicyathiformis ; 3<sup>us</sup> et sequentes longi ; 4<sup>us</sup> 3<sup>o</sup> brevior et latior 5<sup>o</sup> longior et angustior ; clava longiconica, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> multo longior : thorax ovatus : prothorax transversus, mediocris, antice angustior : mesothoracis scutum magnum longitudine paullo latius ; parapsidum suturæ remotæ bene determinatæ, postice approximatae ; scutellum obconicum, bisulcatum : metathorax mediocris, declivis, postice angustior : petiolus brevissimus : abdomen longifusiforme, supra convexum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thorace duplo longius ; segmenta 1<sup>um</sup> ad 3<sup>um</sup> brevia ; 4<sup>um</sup> et 5<sup>um</sup> longiora ; 6<sup>um</sup> et 7<sup>um</sup> subcylindrica : pedes fulvi, simplices, subæquales ; coxæ nigræ ; femora picea, apice fulva ; mesopedum et metapedum tibiæ apice albidæ, tarsi flavi apice fusci : alæ sublimpidæ, abdominis apicem dum quietem agunt non attingentes ; squamulæ piceæ ; nervi fulvi ; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis sat longus ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  ; alar. lin.  $1\frac{3}{4}$ —2.)

Allied to *Tetrastichus Adalia*, Ann. Nat. Hist. xi. 351.

39. *Acrias* (n. g.) *Nileus*, fem. *Purpureus*, antennæ nigræ, pedes nigri, tarsi flavi, proalæ fusco maculatæ.

Corpus gracile, convexum, purpureum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum, cyaneo varium : caput transversum, brevissimum, impressum, thoracis latitudine ; vertex sat latus ; frons abrupte declivis : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ latæ, compressæ, subfusiformes, nigræ, thorace non longiores ; articulus 1<sup>us</sup> longus, apice latior ; 2<sup>us</sup> cyathiformis ; 3<sup>us</sup>, 4<sup>us</sup> et 5<sup>us</sup> mediocres, subæquales ; clava longiconica, acuminata, articulo 5<sup>o</sup> multo longior : thorax longiovatus : prothorax conicus, mediocris : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ bene determinatæ, postice approximatae ; scutellum obconicum : metathorax transversus, brevis : petiolus brevissimus : abdomen teliforme, compressum, supra depressum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thorace multo longius et angustius : pedes nigri, simplices, subæquales ; trochanteres picei ; genua picea ; tarsi flavi, apice fusci ; protarsi fulvi : alæ limpidæ ; squamulæ piceæ ; nervi fusci ; proalæ cuique macula in disco magna indistincta fusca et ad marginem maculæ 6 minores obscuriores ; nervus ulnaris humerali longior, radialis ulnari brevior, cubitalis brevis ; stigma minutum. (Corp. long. lin.  $\frac{3}{4}$  ; alar. lin. 1.)

I have an undescribed British insect that belongs to this new genus.